




# Zadbaj o bezpieczeństwo iniekcji

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa iniekcji skutecznie redukuje ryzyko zakażenia wirusami HCV, HBV i HIV. Zapewnienie bezpieczeństwa iniekcji jest obowiązkiem każdego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.




(na podstawie zaleceń CDC, MMWR 2008 / 57(19):513-517)

## 5 zasad bezpiecznych iniekcji

- Każdą używaną strzykawkę i igłę należy traktować jako materiał skażony/potencjalnie zakaźny. Nie należy ich wykorzystywać повторно.
- Nigdy nie używaj tej samej strzykawki do podawania leków wielu pacjentom. Nie rób tego nawet wtedy, gdy igła została zmieniona.
- Nigdy nie pobieraj leku z fiołki za pomocą używanej strzykawki lub igły.
- Lek z fiołki zawierającej wiele dawek leku lub preparat do stosowania dożylnego w torebce lub butelce stosuj u jednego pacjenta.
- Zmieniaj rękawiczki jednorazowe po kontakcie z każdym pacjentem.

**PRZESTRZEGAJ ZASADY, ABY ZUŻYTE IGŁY WYRZUCAĆ WYŁĄCZNIE DO BEZPIECZNYCH POJEMNIKÓW NA OSTRE, POTENCJALNIE ZAKAŻNE ODPADY MEDYCZNE.**

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA:



Narodowy Instytut Zdrowia  
Publicznego-Państwowy Zakład  
Higieny w Warszawie

PARTNERZY:



Instytut Psychiatrii  
i Neurologii w Warszawie



Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie



Główny Inspektorat  
Sanitarny